

Thyroglobuline

Beschrijving van de test

Naam:	Thyroglobuline
Aanvraag code:	23070
Loinc:	3013-0
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	3 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li-heparine tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 3 dagen na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	CLIA (chemiluminescence immunoassay).
Deelname EKE:	EKE Sciensano / BIO-RAD EQAS

Interferentie:	Thyroglobuline autoantilichamen (anti-TG) kunnen interfereren met de test. Thyroglobulinewaarden kunnen tot enkele maanden na succesvolle behandeling met I-131 verhoogd blijven.
Interpretatie:	Vaststellen van de aan- of afwezigheid van functionerend schildklierweefsel. Differentiële diagnose van aangeboren hypothyroïdie. Opvolging van patiënten met schildkliercarcinoom die een thyroïdectomie hebben ondergaan (TG als tumormerker). Steeds interpreteren met anti-TG resultaat (interferentie !),
Eenheid:	ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	1.82-111.00 ng/mL	1.82-111.00 ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 559230 - 559241 B 300 Doseran van thyroglobuline #(Maximum 1)(Cumulregel [94](#)) (Diagnoseregel [93](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 9.54

Laatst gewijzigd op

04-03-2025