Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Vrije PSA

Beschrijving van de test

Naam:	Vrije PSA
Frequentie:	dagelijks op weekdagen
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Antwerpen
TAT:	1 week
24u/24u:	nee
Accreditatie:	Zie extern labo
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube
Volume:	500 µL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Bloedafname dient te gebeuren voor prostaatonderzoek. Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. De waarde van totaal PSA moet meegestuurd worden.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

Analyse

Analysemethode:	Siemens Atellica chemiluminescentie immunoassay
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant

Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	Een berekening van een vrije/totale PSA ratio met PSA-waarden van verschillende analyzertypes is onbetrouwbaar en wordt niet aanbevolen.
Interpretatie:	Te beoordelen in functie van totaal PSA. De hoeveelheid PSA in het serum dat gecomplexeerd is aan alfa-1-antichymotrypsine is hoger bij prostaatcarcinoom (PCa) dan bij benigne prostaathypertrofie (BPH).
Eenheid:	µg/L

Laatst gewijzigd op

03-11-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.