Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

# neutrofielen antistoffen

## Beschrijving van de test

| | |
|---|---|
| Naam: | neutrofielen antistoffen |
| Synoniemen: | neutrofiele antilichamen, anti-neutrofiele, NAIN, TRALI, autoimmune neutropenie |
| Aanvraag code: | GRA.AS_VZ |
| Aanvraagbrief: | AFAZFAB00003 |
| Uitvoerend labo: | Centrum Hospital Université De Liège Sart-Tilman |
| TAT: | 31 dagen |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Barbara Cauwelier |

## Afname van het materiaal

| | |
|---|---|
| Afname: | Serum |
| Toegelaten materiaal: | perifeer bloed |
| Volume: | Serum 1 mL en EDTA 1 ml (indien ikv neonatale allo-immune neutropenie, dient zowel staal van moeder als neonaat te worden afgenomen) |
| Transportconditie: | Kamertemperatuur |
| Bewaarconditie: | Kamertemperatuur |

## Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|---|---|
| Acceptatie: | Stalen moeten gelabeld zijn met naam, geboortedatum en/of unieke identifier alsook datum staalafname. |
| Bijaanvraag: | Analyse wordt verstuurd naar CHU Luik |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Analysemethode: | Luminex (HNA antistoffen) en PCR-SSP (HNA typering) |
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Interpretatie: | |

Opsporen van granulocytenantistoffen HNA-1a,1b,1c,2,3a,3b,4a,5a en 5b en HNA typering NHA 1,3,4 en 5 bij vermoeden van neonatale alloimmune neutropenie (NAIN) of in kader van onderzoek naar oorzaak van een TRALI (transfusie geassocieerde acute lung injury) . De analyse kan ook gebruikt worden ter bevestiging van een auto-immune neutropenie.

## Tarificatie

| | |
|---|---|
| Nomenclatuur: | 555671 - 555682 B 350 Opzoeken van anti-granulocyten antilichamen in het serum #(Maximum 1)<br>Bron: RIZIV website op 22/11/2026 |

## Laatst gewijzigd op

14-07-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.