Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

# CA 19.9

## Beschrijving van de test

| | |
|---|---|
| Naam: | CA 19.9 |
| Aanvraag code: | 26070 |
| Loinc: | 24108-3 |
| Frequentie: | dagelijks |
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Jan |
| TAT: | 2 dagen |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Michel Langlois |

## Afname van het materiaal

| | |
|---|---|
| Afname: | Serum |
| Toegelaten materiaal: | Plasma |
| Toegelaten recipiënt: | Serum-gel tube, Li-Heparine tube |
| Volume: | 4,7 mL |

## Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|---|---|
| Acceptatie: | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. |
| Bijaanvraag: | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 5 dagen na afname. |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Analysemethode: | Siemens Atellica chemiluminescentie immunoassay (CLIA). |
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Deelname EKE: | Ja |
| Interferentie: | Heterofiele antistoffen. 'High-dose hook' (prozone) effect. |
| Interpretatie: | |

Verhoogd bij pancreaskanker (ductaal adenocarcinoma) en mogelijks bij andere gastro-intestinale kankers, ook bij benigne ziekten (galwegobstructie, cholecystitis, cholangitis, levercirrose, acute en chronische pancreatitis) en mucoviscidose. CA 19-9 door de clinicus steeds te interpreteren in combinatie met CT scan en echografie van het abdomen.

Eenheid: kU/L

### Referentiewaarden

| Leeftijd | Mannen | Vrouwen |
|---|---|---|
| | 37 kU/L | 37 kU/L |

## Tarificatie

Nomenclatuur: 548354 - 548365 B 700 Doseren van carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9) #(Maximum 1)(Cumulregel 201)(Diagnoseregel 46)
Bron: RIZIV website op 22/11/2026

## Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 22.26

## Laatst gewijzigd op

01-07-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.