

Androstanediol glucuronide

Beschrijving van de test

Naam:	Androstanediol glucuronide
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/ 2 weken
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Brussel
TAT:	4 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	500 µL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	3 a-Diol G RIA CT Biosource.
Deelname EKE:	nee

Eenheid: $\mu\text{g/L}$

Tarificatie

Nomenclatuur: 559591 - 559602 B 700 Doseran van androstanediolglucuronide
#(Maximum 1)(Cumulregel [45](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

04-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.