Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Saccharomyces cerevisiae IgG + IgA antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Saccharomyces cerevisiae IgG + IgA antistoffen
Synoniemen:	Anti-saccharomyces cerevisiae antibodes, ASCA, ASCA IgG + IgA
Aanvraag code:	25112
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	1 week
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Volume:	4,7 mL
Transportconditie:	Gekoeld

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay); ImmunoCap 250 (ThermoFisher)
Interpretatie:	De test voor anti-Saccharomyces cereviseae IgG + IgA antilichamen (ASCA) kan samen met de test ANCA (via indirecte immuunfluorescentie) gebruikt worden om te helpen een onderscheid te maken tussen de ziekte van Crohn (CD) en

colitis ulcerosa (UC). ASCA komt vaker voor bij CD (prevalentie 26-69%), een atypisch p-ANCA patroon wordt vaker gezien bij UC (prevalentie 41-73%). Een hoge prevalentie van een atypisch pANCA patroon en van ASCA wordt echter ook waargenomen bij coeliakie patiënten (respectievelijk 22% en 43%) (Moiseev et al. Autoimmunity Reviews 2020).

Eenheid:	U/mL

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro:	28.00

Laatst gewijzigd op

04-03-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.