

Reverse T3

Beschrijving van de test

Naam:	Reverse T3
Synoniemen:	rT3; reverse triiodothyronine; reversed T3
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	3 weken
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Gekoeld
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname.

Analyse

Analysemethode:	Radioimmunoassay (RIA).
Deelname EKE:	nee
Eenheid:	ng/dL

Tarificatie

Nomenclatuur: 435050 - 435061 B 700 Doseran van reverse T3 (rT3)
#(Maximum 1)(Diagnoseregel [58](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

05-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.