Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

# Reverse T3

## Beschrijving van de test

| | |
|---|---|
| Naam: | Reverse T3 |
| Synoniemen: | rT3; reverse triiodothyronine; reversed T3 |
| Frequentie: | Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1x/week |
| Uitvoerend labo: | UZ Leuven campus Gasthuisberg |
| TAT: | 3 weken |
| 24u/24u: | Nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Michel Langlois |

## Afname van het materiaal

| | |
|---|---|
| Afname: | Serum |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube |
| Volume: | 1 mL |
| Transportconditie: | Gekoeld |
| Bewaarconditie: | Koelkast |

## Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|---|---|
| Acceptatie: | Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. |
| Bijaanvraag: | Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Analysemethode: | Radioimmunoassay (RIA). |
| Deelname EKE: | Neen |
| Eenheid: | ng/dL |

## Tarificatie

| | |
|---|---|
| Nomenclatuur: | 435050 - 435061 B 700 Doseren van reverse T3 (rT3)<br>#(Maximum 1)(Diagnoseregel 58)<br>Bron: RIZIV website op 22/11/2026 |

## Laatst gewijzigd op

05-06-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.