Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Amiodarone

Beschrijving van de test

Naam:	Amiodarone
Synoniemen:	Cordarone
Aanvraag code:	28234
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Frequentie:	Tweewekelijks
Uitvoerend labo:	Universitair ziekenhuis Saint-Luc
TAT:	3 weken
24u/24u:	nee
Accreditatie:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Volume:	4,9 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode bloedafname - staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Calcul; Waters UPLC
Interpretatie:	Toxisch als dalwaarde >3 mg/L D. Esethylamiodarone is een actieve metaboliet van amiodarone. Analyse wordt automatisch uitgevoerd met amiodarone.

De belangrijkste metaboliet van amiodaron, het desethylamiodaron (DEA), draagt bij tot het therapeutisch effect. Er is een relatie aangetoond tussen de (desethyl)amiodaron plasmaspiegel en de antiaritmische werking. Verder worden met name toxiciteit in het centraal zenuwstelsel en pulmonale toxiciteit geassocieerd met hoge (desethyl)amiodaronspiegels. Het routinematige bepalen van amiodaronspiegels tijdens chronisch gebruik is echter niet zinvol gebleken in het sturen van therapeutisch of toxische effecten. Bij het instellen van de amiodarondosering en bij twijfel omtrent effectiviteit en/of bijwerkingen kan spiegelbepaling zinvol zijn. Bron: https://tdm-monografie.org/amiodaron/

Eenheid:	µg/mL

Tarificatie

Nomenclatuur:	548052 - 548063 B 350 Doseren van een anti-aritmisch geneesmiddel of van de actieve metaboliet ervan #(Maximum 2)(Diagnoseregel 46) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

11-08-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.