Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

CRP

Beschrijving van de test

Naam:	CRP
Synoniemen:	C-reactief proteïne, CRP
Aanvraag code:	24060
Loinc:	1988-5
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Li-heparine, Serum gel tube
Volume:	2,6 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - staalontvangst 90min
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag: 48 uren max.

Analyse

Analysemethode:	Turbidimetrie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant

Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	1. Hemolyse >500mg/dL; Bilirubine (ongeconjugeerd) >30mg/dL; Bilirubine (geconjugeerd) >30mg/dL; Lipemie L-index >500. 2. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström's macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.
Interpretatie:	Als positief acuut-fase eiwit stijgt CRP (c-reactief proteïne) bij onstekingsprocessen, infectie, trauma en weefselschade, tumoren, en auto-immuunaandoeningen.
Eenheid:	mg/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	5.0 mg/L	5.0 mg/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	541052 - 541063 B 100 Doseren van CRP met een immunologische methode #(Maximum 1) (Cumulregel 35, 354) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

19-11-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.