Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

# Fruhsommer encephalitis (IgG IgM)

## Beschrijving van de test

| | |
|---|---|
| Naam: | Fruhsommer encephalitis (IgG IgM) |
| Synoniemen: | Fruhsummer meningo encephalitis - TBE - Tickborne encephalitis |
| Aanvraag code: | 56238 |
| Frequentie: | Verzending dagelijks - analyse 1x/week |
| Uitvoerend labo: | Instituut voor Tropische Geneeskunde |
| TAT: | 9 dagen (TAT onderaannemer 7 dagen) |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Marijke Reynders |

## Afname van het materiaal

| | |
|---|---|
| Afname: | Serum |
| Toegelaten materiaal: | Lumbaal |
| Toegelaten recipiënt: | Serum gel tube, steriele tube |
| Volume: | 2,7 mL |
| Transportconditie: | Kamertemperatuur |
| Bewaarconditie: | Koelkast |

## Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|---|---|
| Acceptatie: | Gestold bloed of CSV wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. Klinische inlichtingen meesturen. |
| Bijaanvraag: | Indien het serum of CSV een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen. |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Analysemethode: | IFA voor IgG & IgM |
| Interferentie: | Kruisreacties met andere flavivirussen zijn mogelijk (post-infectie of post-vaccinatie bv gele koorts vaccin, TBEV of JEV vaccin). Een positief resultaat moet door een meer specifieke seroneutralisatietest (RFFIT) bevestigd worden. |
| Interpretatie: | In de eerste week na het begin van de koorts kan het virus zelf opgespoord worden met PCR in lichaamsvochten, in die periode vaak gepaard gaand met een nog negatieve serologie (ventserperiode).<br>Vermeld steeds land van herkomst, datum start symptomen en datum staalafname op het aanvraagformulier. |

## Tarificatie

| | |
|---|---|
| Nomenclatuur: | 551250 - 551261 B 500 Opsporen van antilichamen tegen tropische virussen (gele koorts, Dengue, West-Nile, Chikungunya, hemorrhagische koortsvirussen) #(Maximum 5)(Cumulregel 328)<br>Bron: RIZIV website op 22/11/2026 |

## Laatst gewijzigd op

04-03-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.