

## Procollageen type 1 propeptide

### Beschrijving van de test

Naam:	Procollageen type 1 propeptide
Frequentie:	Verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	4 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5 mL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 5 dagen na afname.

### Analyse

Analysemethode:	Immunoassay
Deelname EKE:	nee
Interpretatie:	Merker van botformatie. Indicaties voor testaanvraag: o.m. predictie van osteoporose en risico op fractuur, monitoring therapie respons, predictie en

detectie van botmetastasen.

P1NP is superieur of tenminste evenwaardig t.o.v. de andere botformatie-merkers BAP (ostase) en osteocalcine:

- Minst specifieke botformatie merker. Reflecteert de hoeveelheid nieuw gesynthetiseerd collageen type I.
- Gelijkwaardig aan bot alk.fos. Voor monitoring (ziekte van Paget, hemodialyse, etc.)
- Snellere en meer uitgesproken respons bij therapie monitoring (bifosfonaten).
- Risico-gestratificeerde predictor voor botmetastasen bij vroegstadium borstkanker (>75 ng/mL cut-off).
- Vanuit analytisch standpunt is P1NP een zeer stabiele en meer performante, geautomatiseerde test.

Eenheid:  $\mu\text{g/L}$

## Tarificatie

Nomenclatuur: 542894 - 542905 B 400 Doseran van de botaanmaak  
#(Maximum 1) (Cumulregel [77](#)) (Diagnoseregel [71](#))  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

04-12-2024