Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Prealbumine

Beschrijving van de test

Naam:	Prealbumine
Frequentie:	Verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube
Volume:	200 µL
Transportconditie:	Ingevroren

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

Analyse

Analysemethode:	Nefelometrie
Deelname EKE:	Neen
Interpretatie:	Prealbumine is een negatief acute fase eiwit waarvan de concentratie daalt bij inflammatie en bij leverlijden. Door de korte halfwaardetijd (1 à 2 dagen) is het een merker voor kortetermijn nutritionele status.

Eenheid:	g/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	540993 - 541004 B 125 Doseren van prealbumine (transthyretine) met een immunologische methode #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

06-08-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.