

Brucella spp IgM

Beschrijving van de test

Naam:	Brucella spp IgM
Aanvraag code:	56324
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00007
Loinc:	56631-5
Frequentie:	1 of 2x/week, in functie van het aantal aangevraagde analyses
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	4 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Indirecte Chemiluminescentie immuno-assay (Virclia)
Deelname EKE:	SKML

Interferentie:	<p>Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.</p> <p>Kruisreacties tussen <i>Brucella abortus</i> en <i>Brucella melitensis</i> komen frequent voor. Vals positieve resultaten zijn mogelijk (o.a. na vaccinatie tegen <i>Vibrio cholerae</i> en bij infectie met <i>Francisella tularensis</i>).</p>
Interpretatie:	<p>Brucellose is een belangrijke ziekte bij zowel mensen als gedomesticeerde dieren en is een systemische bacteriele infectie veroorzaakt door gramnegatieve coccobacillen van het geslacht <i>Brucella</i>. Brucellose is een zoonose, en diverse gedomesticeerde dieren fungeren als reservoirs: <i>Brucella</i> infecteert geiten (<i>Brucella melitensis</i>), runderen (<i>Brucella abortus</i>), varkens (<i>Brucella suis</i>) en honden (<i>Brucella canis</i>).</p> <p>Overdracht op de mens vindt plaats via direct contact met geïnfecteerde dieren, blootstelling aan infectieuze aerosolen of consumptie van niet-gepasteuriseerde zuivelproducten; overdracht van mens op mens komt niet voor. Hoewel er in de Verenigde Staten slechts weinig gevallen worden gemeld, komen de meeste infecties voor in het Middellandse Zeegebied, West-Azie en delen van Latijns-Amerika en Afrika.</p> <p>Drie <i>Brucella</i>-soorten veroorzaken frequent ziekte bij de mens: <i>B. melitensis</i>, <i>B. suis</i> en <i>B. abortus</i>. Klinische manifestaties van brucellose bestaan uit koorts, zweten, malaise, gewichtsverlies, hoofdpijn en zwakte. Het begin van de symptomen kan sluipend of acuut zijn, en treedt doorgaans op binnen 2 tot 4 weken na blootstelling. Elk orgaan of orgaansysteem kan bij de infectie betrokken zijn, hoewel sterfte zeldzaam is.</p> <p>Een vermoedelijke diagnose van brucellose kan worden gesteld door het aantonen van hoge of stijgende titers van specifieke antilichamen. IgM-antilichamen verschijnen tijdens de eerste week van de infectie, gevolgd door een overschakeling naar IgG-productie in de tweede week. Voor de diagnostiek van <i>Brucella</i>-infectie zijn diverse serologische testen beschikbaar. Het aantonen van anti-<i>Brucella</i>-antilichamen met behulp van een enzymgekoppelde immunosorbentassay (ELISA) blijkt een gevoelige diagnostische methode te zijn. Echter, alle monsters die positief testen met ELISA dienen te worden bevestigd met een agglutinatiemethode om de specificiteit van de test te verhogen. Bij een hoog klinisch vermoeden is het aangewezen serologische diagnostiek na 14 - 21 dagen te herhalen.</p>
Eenheid:	Index

Tarificatie

Nomenclatuur: 551014 - 551025 B 80 Opsporen van antilichamen tegen
Brucellae #(Maximum 1) (Cumulregel [326](#))
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

Laatst gewijzigd op

07-08-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.