

GGT

Beschrijving van de test

Naam:	GGT
Synoniemen:	Gamma-GT, GGT
Aanvraag code:	21240
Loinc:	2324-2
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Li-heparine, Serum gel tube
Volume:	2,6 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	<ul style="list-style-type: none">• Periode bloedafname - staalontvangst 90min• Patiëntenlabel aanwezig• In recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten 48 uren max.

Analyse

Analysemethode:	Colorimetrie.
-----------------	---------------

IVDR status: CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE: Sciensano Chemie; BIO-RAD EQAS - Clinical chemistry
Interferentie:

1. Hemolyse;
Bilirubine, geconjugeerd >10 mg/dL;
bilirubine, ongeconjugeerd >10mg/dL
Lipemie L-index>500.
2. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström's macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.

Interpretatie: Verhoogde waarden bij:

- Aandoeningen van lever en gal
- Patiënten die gedurende lange tijd medicatie nemen zoals phenobarbital en phenytoïne.

Is eveneens een gevoelige screeningtest voor verdoken alcoholisme

Eenheid: U/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 6 maand	143 U/L	143 U/L
6 maand-11 jaar	33 U/L	33 U/L
11 jaar-19 jaar	31 U/L	22 U/L
> 19 jaar	73 U/L	38 U/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 541892 - 541903 B 80 ° Doseran van de gammaglutamyltransferasen #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

24-12-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.