Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

vWF antigeen

Beschrijving van de test

Naam:	vWF antigeen
Synoniemen:	VWF
Aanvraag code:	13015
Loinc:	28000-8
Frequentie:	2-wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	3 weken
TAT Dringend:	24 uur (op werkdagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Citraat
Toegelaten recipiënt:	Citraat
Volume:	1 mL bloed of 500µL plasma (citraatbuizen echter steeds volledig vullen bij afname)
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - staalontvangst 3 uur
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag:

- 3 uur indien bewaard op KT° of frigo
- tot 3 maand in functie van beschikbaarheid van staal indien ingevroren

Analyse

Analysemethode:	Latex immunoturbidimetrie.
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	De aanwezigheid van reumafactor kan een overschatting van het testresultaat veroorzaken.
Interpretatie:	Verlaagde waarden voor VWF-antigen kunnen wijzen op von Willebrand ziekte, maar resultaten moeten samen geïnterpreteerd worden met de waarden van VWF activiteit (ristocetine cofactor), FVIII activiteit, plaatjesfunctieanalyse (PFA en aggregometrie) en multimeeranalyse.
Eenheid:	%

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Bloedgroep O : 42-141% Bloedgroep A/B/AB : 66-176% %	Bloedgroep O : 42-141% Bloedgroep A/B/AB : 66-176% %

Tarificatie

Nomenclatuur:	554271 - 554282 B 350 Doseren van de von Willebrand factor (antigeen) #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

07-09-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.