

Bartonella PCR

Beschrijving van de test

Naam:	Bartonella PCR
Synoniemen:	Bartonella, Cat scratch disease, kattekrabziekte
Aanvraag code:	55002
Loinc:	48864-3
Frequentie:	3x/week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	max. 72 uur
TAT Dringend:	4 uur
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Klierbiopsie -en punctie, abcespunctie
Toegelaten materiaal:	Volbloed, diepe wisser doordrenkt van etter, CSV, weefsel
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje, EDTA-volbloed, eswab, CSV in steriele tube of potje
Volume:	1 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Correct en onbeschadigd recipient met duidelijke identificatiegegevens.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00004 Aanvraagbrief Microbiologische diagnostiek Indien het monster een correcte pre-analytische fase doorliep en veilig bewaard zit (zie bewaarcondities), is dit toegelaten.

Analyse

Analysemethode:	Real-time PCR.
Deelname EKE:	nee

Interpretatie:

Kattekrabziekte (cat-scratch disease, CSD) CSD is de meest frequente humane infectie veroorzaakt door *B. henselae*, een kleine pleomorfe fastidieuze gram-negatieve intracellulaire coccobacil die erg moeilijk te kweken is. De klinische presentatie van *Bartonella henselae* infecties kan divers zijn, en hangt in het bijzonder af van de onderliggende immunstatus van de patiënt. In immunocompetente patiënten blijft CSD voornamelijk beperkt tot een gelokaliseerde, vaak prominente regionale lymfadenopathie gedurende een tweetal weken na inoculatie, en deze kan persisteren gedurende vele weken met consequent levenslange immuniteit. De betrokken lymfeklieren zijn meestal pijnloos met vaak erytheem van de overliggende huid. De meeste patiënten ervaren als systemische klachten koorts, malaise, anorexia, vermoeidheid, gegeneraliseerde pijnen, en hoofdpijn. Een beschreven geschiedenis van een contact met een kat is aanwezig in >60% van de gevallen, en een primair inoculatieletsel (huid, ooggranuloma, mucus membraan) kan aangetoond in 61% van de patiënten. Atypische systemische manifestaties kunnen gezien worden in ca. 10% van alle *B. henselae* infecties. Deze zijn meer frequent in kinderen en immunogecompromitteerde personen (bijvoorbeeld HIV seropositieve, post-SOTx, neoplasie). Verschillende orgaanstelsels kunnen betrokken zijn (encephalitis, lever- & miltabcessen) en in zeldzame gevallen kan *B. henselae* vasculaire proliferatieve lesies genereren, neurologische of cardiale ziekte, en osteomyelitis. De incidentie van *Bartonella* infecties is moeilijk vast te leggen gezien er geen verplichte aangifte is en gezien vele gevallen van *Bartonella* infecties niet herkend worden of ambulant gezien worden. In België is de gevalueerde incidentie (gebaseerd op data van UCL 1993-2001, IPH-rapport) 1.98/100.000. Onze bevindingen zijn vergelijkbaar met deze in de USA: 0.77-0.86/100.000. De therapeutische benadering van CSD infectie varieert in functie van de klinische manifestaties en de gekende immunstatus van de patiënt. In het algemeen dienen patiënten meestal vooral worden gerustgesteld dat de adenopathie goedaardig is, en dat die spontaan zal afnemen binnen 2 ... 4 maanden. Immunocompetente patiënten met milde tot matige gelokaliseerde symptomen vereisen enkel symptomatische ondersteunende therapie aangezien de symptomen spontaan verdwijnen in ongecompliceerde *Bartonella*-infectie. CSD diagnose moet berusten op een combinatie van epidemiologische, serologische, klinische, histologische en bacteriologische criteria. Jammer genoeg is er geen diagnostische gouden standaard. Margileth et al. stelden de volgende diagnostische criteria voor CSD voor (aanwezigheid van minstens 3 criteria): 1. Contact met kat of vlo al dan niet gepaard gaand met duidelijke inoculatiesite, 2. Negatieve serologie voor andere oorzaken van adenopathie, punctievocht

uit lymfeklier dat steriel blijft in bacteriële kweek, positieve PCR assay, en/of lever/milt-letsels gezien op CT scan, 3. Positieve enzyme immunoassay of IFA test met een titer van = 1:64, 4. Biopsie die granulomateuze inflammatie aantoon consistent met CSD of een positieve Wartin-Starry (WS) kleuring.

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 33.00

Laatst gewijzigd op

02-03-2026