Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Granulocytenadhesie. CD18/CD11 expressie

Beschrijving van de test

Naam:	Granulocytenadhesie. CD18/CD11 expressie
Frequentie:	De analyse wordt enkel op maandag en dinsdag uitgevoerd
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	Dr Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Volbloed li-heparine verzenden naar UZ Leuven
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- Afname enkel op maandag- of dinsdagmorgen voor 09u00, direct verzenden naar UZ Leuven met koerier
- Patiëntenlabel aanwezig
- In recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag: Glimscode 24890

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie
Interpretatie:	De analyse wordt uitgevoerd om de granulocytenfunctie te evalueren igv vermoeden van cellulaire immuundeficiënte, in het bijzonder igv recidiverende infecties van huid of slijmvliezen, slechte wondgenezing of vertraagde navelheling bij neonaten,

vaak gepaard met leukocytose.
De granulocytenadhesie wordt vaak aangevraagd in combinatie met de analyse van het granulocyten oxidatief metabolisme (DHR oxidatieve burst) (apart aan te vragen).

Tarificatie

Nomenclatuur:	555671 - 555682 B 350 Opzoeken van anti-granulocyten antilichamen in het serum #(Maximum 1) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

15-09-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.