

HIV antigeen-antistof

Beschrijving van de test

Naam:	HIV antigeen-antistof
Aanvraag code:	56103
Loinc:	56888-1
Frequentie:	Dagelijks met uitzondering van weekend- en feestdagen. Indien HIV-detectie noodzakelijk is in weekend: gelieve HIV-sneltest aan te vragen op urgentie-aanvraagformulier.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	8 uur - 3 dagen
24u/24u:	Nee, maar wel evenwaardig alternatief nl. een HIV-
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Chemiluminescent Microparticle Immunoassay (CMIA- Alinity i)
Deelname EKE:	Sciensano / NRL

Interferentie: Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.

Interpretatie: De test detecteert niet -Ile geïnfecteerde personen. De test maakt geen onderscheid tussen p24 antigeen, anti-HIV1 en anti-HIV2 (combo-test). Daar vals-positieve resultaten mogelijk zijn, wordt elk positief of borderline monster van een niet-gekende patient doorgestuurd naar een aids-referentielabo ter confirmatie via immunoblotting en eventueel additionele moleculaire testen.

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Negatief	Negatief

Tarificatie

Nomenclatuur: 551736 - 551740 B 250 Opzoeken van HIV - antilichamen
#(Maximum 1) (Cumulregel [328](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

17-12-2025