Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Treponema TP-HA in serum

Beschrijving van de test

Naam:	Treponema TP-HA in serum
Aanvraag code:	56316
Loinc:	26009-1
Frequentie:	2x per week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	8 uur - 4 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed en tevens lumbaal vocht wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum of lumbaal vocht een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	TPHA
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	

Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.

Interpretatie:	De TPHA test gebeurt enkel indien TREP (treponemale test op Architect) in serum twijfelachtig/positief blijkt of indien er een vermoeden is van neurosyphilis. Bij de interpretatie dient rekening gehouden te worden met andere syphilistesten. Een positieve reactie kan ook voorkomen bij patienten geinjecteerd met bloedderivaten waaronder immunoglobulines. Deze treponemale test gebeurt tevens op lumbaalvocht bij vermoeden van neurosyphilis (en in parallel op serum, afgenomen binnen 24u), ter berekening van de index van Witmer en het nagaan van een eventuele intrathecale specifieke IgG productie.
Eenheid:	Titer

Tarificatie

Nomenclatuur:	552731 - 552742 B 250 Diagnose van een infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een specifiek antigeen wordt gebruikt #(Maximum 1) (Cumulregel 326) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

06-10-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.