

Treponema TP-PA in CSV

Beschrijving van de test

Naam:	Treponema TP-PA in CSV
Aanvraag code:	56318
Loinc:	50695-6
Frequentie:	2x per week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	8 uur - 4 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	CSV
Toegelaten recipiënt:	Steriele tube
Volume:	500 æL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Lumbaal vocht wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het lumbaal vocht een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	TPHA
Deelname EKE:	Sciensano
Interferentie:	Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.

Interpretatie: De TPHA test gebeurt enkel indien er een vermoeden is van neurosyphilis. Bij de interpretatie dient rekening gehouden te worden met andere syphillistesten. Een positieve reactie kan ook voorkomen bij patiënten geïnjecteerd met bloedderivaten waaronder immunoglobulines. Deze treponemale test gebeurt tevens op lumbaalvocht bij vermoeden van neurosyphilis (en in parallel op serum, afgenomen binnen 24u), ter berekening van de index van Witmer en het nagaan van een eventuele intrathecale specifieke IgG productie.

Eenheid: Titer

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	Niet reactief 1/20 Titer	Niet reactief 1/20 Titer

Tarificatie

Nomenclatuur: 552731 - 552742 B 250 Diagnose van een infectie door Treponema in bloed of cerebrospinaal vocht met een techniek waarbij een specifiek antigeen wordt gebruikt #(Maximum 1) (Cumulregel [326](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

06-10-2025