Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Solubel CD25

Beschrijving van de test

Naam:	Solubel CD25
Synoniemen:	Solubel IL2 rec alfa (interleukine 2 receptor alfa), sCD25
Aanvraag code:	sol.CD25_VZ
Frequentie:	verzending op werkdagen
Uitvoerend labo:	ULB Erasmus Campus - Immunologie
TAT:	3 maand. In batch geanalyseerd door uitvoerend labo, in functie van aantal aanvragen.
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Sylvie Roggeman

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Volume:	>1 mL volbloed of >500µL serum
Transportconditie:	Ingevroren

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- Periode bloedafname - staalontvangst 48 uur
- Patiëntenlabel aanwezig
- In recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Analyse

Interpretatie:

Een sterk verhoogd solubel CD25 (sIL-2R) is een van de diagnostische criteria voor hemofagocytaire lymfohistiocytose (HLH, 'hemofagocytair syndroom'). Voor de diagnose van HLH dient voldaan te worden aan minstens 5 van volgende 8 criteria: koorts, splenomegalie, cytopenie, hypertriglyceridemie en/of hypofibrinogenemie, hyperferritinemie, hemofagocytose,

verlaagde NK-celfunctie, verhoogd solubel CD25 (sCD25/sIL2-rec. Ook de analyse van perforine in de NK- en T-cellen kan bijdragen aan de diagnosestelling.

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro:	30.19

Laatst gewijzigd op

29-09-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.