

Antistreptolysine O antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Antistreptolysine O antistoffen
Synoniemen:	Streptokokken antistoffen
Aanvraag code:	56241
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00007
Loinc:	5370-2
Frequentie:	2 x per week in functie van het aantal aanvragen
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	7 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Enzyme-immunoassay (ELISA Apdia).
-----------------	-----------------------------------

Deelname EKE:	INSTAND
Interferentie:	Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Interpretatie:	<p>Semi-kwantitatieve detectie van anti-streptolysine O in serum of plasma, dat in 80 tot 85 % van de gevallen van recente streptococcen-infectie (groep A, C en G), verhoogd is.</p> <p>Een titerstijging of daling heeft meer betekenis dan een enkelvoudige titer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volwassenen: <ul style="list-style-type: none"> ◦ ?200 IU/mL: geen significante, diagnostische betekenis ◦ >200 IU/ml: mogelijkheid van acute of recente infectie • Kinderen: normale waarde 100 IU/mL.
Eenheid:	IU/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 551073 - 551084 B 80 Opsporen van antilichamen van antistreptolysines #(Maximum 1) (Cumulregel [325](#)) (Diagnoseregul [94](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

02-12-2025