Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Antistreptolysine O antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Antistreptolysine O antistoffen
Synoniemen:	Streptokokken antistoffen
Aanvraag code:	56241
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00007
Loinc:	5370-2
Frequentie:	2 x per week in functie van het aantal aanvragen
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	7 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Enzyme-immunoassay (ELISA Apdia).

Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.

Interpretatie:	Semi-kwantitatieve detectie van anti-streptolysine O in serum of plasma, dat in 80 tot 85 % van de gevallen van recente streptococcen-infectie (groep A, C en G), verhoogd is.
	
	Een titerstijging of daling heeft meer betekenis dan een enkelvoudige titer.
	
	• Volwassenen:
	  ○ ?200 IU/mL: geen significante, diagnostische betekenis
	  ○ >200 IU/ml: mogelijkheid van acute of recente infectie
	• Kinderen: normale waarde 100 IU/mL.

Eenheid:	IU/mL

Tarificatie

Nomenclatuur:	551073 - 551084 B 80 Opsporen van antilichamen van antistreptolysines #(Maximum 1) (Cumulregel 325) (Diagnoseregel 94) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

09-10-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.