Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

# Bacteriële kweek catheter

## Beschrijving van de test

| | |
|---|---|
| Naam: | Bacteriële kweek catheter |
| Synoniemen: | CLABSI, CRBSI, catheter |
| Aanvraag code: | 51A10 |
| Aanvraagbrief: | AFAZFAB00004 |
| Loinc: | 90274-2 |
| Frequentie: | Dagelijks |
| TAT: | 5 dagen |
| 24u/24u: | Nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Katelijne Floré |

## Afname van het materiaal

| | |
|---|---|
| Afname: | Arterieel, centraal veneus, perifeer veneus, dialyse, jugularis, PICC, port-à-cath (PAC), VP shunt, Hickman, andere.<br>Bij vermoeden van een cathetersepsis, gelijktijdig bloedkweken afnemen via de catheter en via een perifere afname, voor toediening van antibiotica. De catheter gelijktijdig met bloedkweken insturen. |
| Toegelaten recipiënt: | Steriel potje |

## Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|---|---|
| Acceptatie: | Het staal wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht. |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Analysemethode: | Rolplaat methode, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling. |
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Deelname EKE: | Ja |

| | |
|---|---|
| Interpretatie: | Groei van >15 CFU van een cathetersegment van 5 cm is suggestief voor de bacteriële kolonisatie van de catheter. Indien er geen vermoeden van cathetersepsis bestaat moeten catheters die verwijderd worden, niet voor routine kweek naar het laboratorium gestuurd worden. |

## Laatst gewijzigd op

18-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.