Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

# Surveillance VRE screening

## Beschrijving van de test

| | |
|---|---|
| Naam: | Surveillance VRE screening |
| Aanvraagbrief: | AFAZFAB00004 |
| Loinc: | 5953 |
| Frequentie: | Dagelijks |
| TAT: | 2 dagen |
| 24u/24u: | Nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Katelijne Floré |

## Afname van het materiaal

| | |
|---|---|
| Afname: | FSA (Eswab). Breng de wisser intrarectaal, draai deze voorzichtig rond en verwijder. Plaats de wisser in transportmedium (roze dop). Breek het stokje af, sluit met de dop en label correct. Voor indicaties wie wanneer te screenen, zie intranet – edoc – Vancomycine Resistente Enterokokken (VRE) screening. |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Analysemethode: | Kweek op een chromogene selectieve bodem, identificatie en uitvoeren van gevoeligheidsbepaling (antibiogram). |
| IVDR status: | CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant |
| Deelname EKE: | Sciensano, SKML, UK NEQAS |
| Interpretatie: | Enterococcen zijn darmbacteriën vandaar dat het rectum (en niet het perineum of de liesplooien) moet bemonsterd worden. VRE zijn meestal E. faecium, occasioneel E. faecalis of andere. Ze vertonen een verworven resistentie voor glycopeptiden (vancomycine) en zijn vaak multi-drug resistent waardoor zeer moeilijk te behandelen.<br>Tweemaal per jaar worden alle dialysepatiënten gescreend op aanwezigheid van VRE. Daarnaast worden hemato-patiënten wekelijks gescreend op indicatie. |

| Laatst gewijzigd op | |
|---|---|
| 02-07-2025 | Didier Timmerman |

Copyright © 2025 All rights reserved.