

Screening primaire immuundeficiënties (PID/IEI)

Beschrijving van de test

| | |
|----------------------------|---|
| Naam: | Screening primaire immuundeficiënties (PID/IEI) |
| Synoniemen: | Memory B cellen, PID, IEI |
| Aanvraag code: | 16026 |
| Frequentie: | Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf. |
| TAT: | 2 dagen (maandag-donderdag) 4 dagen (vrijdag) |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | dr. Jan Emmerechts |

Afname van het materiaal

| | |
|-----------------------|----------------|
| Afname: | EDTA |
| Toegelaten recipiënt: | Perifeer bloed |
| Volume: | 2,7 mL bloed |

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|--------------|---|
| Acceptatie: | <ul style="list-style-type: none">• Periode bloedafname - staalontvangst 24u• Patiëntenlabel aanwezig• In recipiënt zoals aangegeven in de labogids |
| Bijaanvraag: | 24u |

Analyse

| | |
|-----------------|--|
| Analysemethode: | Flowcytometrie. |
| IVDR status: | LDT: in huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek |
| Deelname EKE: | Sciensano voor T, B en NK lymfocyten |
| Interpretatie: | <p>Deze analyse wordt aangevraagd i.g.v. vermoeden van immuundeficiëntie o.b.v. klinische symptomen. Naast een analyse van het aantal T, B en NK lymfocyten wordt een verdere subclassificatie van de B- en T-lymfocyten gemaakt. De merkers CD27 en IgD worden gebruikt om de B-lymfocyten verder te sub classificeren. IgD wordt hierbij gebruikt om onderscheid te maken tussen 'non switched' (=IgD+) en 'class switched' (=IgD-), terwijl CD27 wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen 'non-memory' (CD27-) en 'memory' (CD27+). O.b.v. deze 2 merkers kunnen volgende subpopulaties gedefinieerd worden binnen de B-lymfocyten: 'Naïeve B-lymfocyten' (CD27-/IgD+), 'Non-switched memory B-lymfocyten' of 'Marginale Zone Like B-lymfocyten' (CD27+/IgD+), 'Class-Switched Memory B-lymfocyten' (CD27+/IgD-) en 'Class switched double negative B-lymfocyten' (CD27-/IgD-).</p> <p>CD45RA en CD27 worden gebruikt om 'Naïeve T-lymfocyten' (CD27+/CD45RA+) te onderscheiden van niet-naïeve T-lymfocyten, binnen de CD4+ en CD8+ T-lymfocyten.</p> |

Laatst gewijzigd op

02-06-2026