Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Bacteriële kweek (uro)genitale stalen

Beschrijving van de test

Naam:	Bacteriële kweek (uro)genitale stalen
Synoniemen:	Gonokokken, Neisseria gonorrhoeae, GBS, Streptococcus agalactiae
Aanvraag code:	Aerobe kweek: 51710
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Loinc:	10352-3
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	3-5 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Vrouw: cervix, vulva, vagina, urethra, placenta, Bartholincyste, amnionvocht. Man: urethra, penisuitstrijk, prostaatvocht
Toegelaten recipiënt:	eSwab, steriel potje, spuit
Volume:	Vocht: bij voorkeur >1 mL.

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	De voorkeurstechniek voor de diagnose van N. gonorrhoeae is PCR (SOA panel). Kweek voor gonokokken moet binnen de 3 uur verwerkt zijn aangezien de bacterie is erg gevoelig voor droogte en temperatuurschommeling.

Analyse

Analysemethode:	Microscopie, kweek, identificatie en gevoeligheidsbepaling.

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antibioticatherapie staan.
Interpretatie:	Kweek van bacteriële pathogenen uit genitale tractus (inclusief Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma spp.) met identificatie. S. aureus wordt enkel gerapporteerd om de gevoeligheid tegen oxacilline te bepalen en wijst meestal op kolonisatie. De aanwezigheid van Enterobacterales, meestal E. coli, worden niet gerapporteerd.

Laatst gewijzigd op

02-11-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.