Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Tryptase

Beschrijving van de test

Naam:	Tryptase
Aanvraag code:	24500
Frequentie:	Wekelijks op maandag
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	8 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li heparine tube
Volume:	2,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode bloedafname - staalontvangst 90 min; 2)Stalen gelabeld; 3)In conform recipiënt
Bijaanvraag:	mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	FEIA (fluoro-enzyme-immunoassay)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Interpretatie:	Tryptase is een biomarker voor mastcelactivatie (bv. bij IgE-gemedieerde allergische reacties) en voor de opvolging van klonale mastcelaandoeningen (primair/klonaal mastcel activatie syndroom, systemische mastocytose). Evaluatie van tryptase in het kader van anafylactische reacties vereist twee bloedafnames: één staal binnen de zes uur na anafylaxie (idealiter 30-120 min. na start symptomen) en één staal ten

minste 24u na verdwijnen klinische symptomen als vergelijkingsstaal (alternatief: staal afgenomen vòòr anafylaxie dat ingevroren bewaard werd - contacteer het labo hiervoor om de beschikbaarheid na te gaan). Bij patiënten met een normale baseline tryptase (8 µg/L) is mastcelactivatie bewezen indien de acute tryptaseconcentratie >= ((baseline x 1,2) + 2 µg/L).

Eenheid: µg/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	11.5 µg/L	11.5 µg/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 542813 - 542824 B 700 Doseren van tryptase in het serum #(Maximum 1) (Diagnoseregel 87)
Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Tarificatie buiten nomenclatuur

Prijs in euro: 22.26

Laatst gewijzigd op

07-08-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.