

ANA geassocieerde antistoffen (immunoblot)

Beschrijving van de test

Naam:	ANA geassocieerde antistoffen (immunoblot)
Synoniemen:	ANA blot, nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomen, histonen, ribosomaal P eiwit, Rib P, AMA-M2, DFS70
Aanvraag code:	25090 + 25020
Frequentie:	tweewekelijks
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Immunoblotting; EUROBlotMaster (EUROIMMUN).
Interpretatie:	Deze blot kan uitgevoerd worden op specifieke vraag om auto-antistoffen op te sporen in kader van SLE, MCTD,

Sjögren syndroom, progressieve SSc, poly-/dermatomyositis, overlap syndromen, CREST syndroom en PBC

- Met deze blot worden IgG auto-autoantistoffen opgespoord tegen 16 verschillende nucleaire, cytoplasmatische en mitochondriale antigenen: nRNP/Sm, Sm, SS-A (natief), Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, rib. P-protein, AMA-M2, DFS70
- Analyse wordt enkel terugbetaald indien positieve ANA screening met indirecte immunofluorescentie (aanvraagcode 25020)

Laatst gewijzigd op

26-02-2025