Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Schimmelkweek

Beschrijving van de test

Naam:	Schimmelkweek
Synoniemen:	Fungale kweek
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00004
Frequentie:	Dagelijks
TAT:	Maximum 28 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr Katelijne Floré

Afname van het materiaal

Afname:	Respiratoire stalen, vochten of punctaten, weefsels of biopten, oculaire stalen
Toegelaten recipiënt:	Steriel potje of buisje met schroefdop

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gelieve klinische info te verschaffen.
Bijaanvraag:	Binnen de 24u

Analyse

Analysemethode:	Microscopisch onderzoek na calcofluor kleuring, kweek en identificatie op specifieke bodems (Sabouraud agar) en eventueel antimycogram (niet standaard, in uitzonderlijke gevallen). Voor Aspergillus fumigatus species complex kan ook een screening naar azoleresistentie uitgevoerd worden, vb bij therapiefalen.
IVDR status:	LDT: in huis ontwikkelde in-vitro diagnostiek
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	

Monsters worden bij voorkeur afgenomen bij patiënten die niet onder antifungale therapie staan.

Interpretatie:	Opsporen van verwekkers van oppervlakkige mycosen (vb de dermatofyten Trichophyton, Microsporum en Epidermophyton; verwekkers van tinea) en verwekkers van diepe mycosen. Bij de diepe mycosen maken we een onderscheid tussen mycosen die we als importpathologie beschouwen (histoplasmose, sporothrichose, coccidioidomycocose en chromoblastomycose) en de mycosen die we in toenemende mate diagnosticeren bij immuungedeprimeerde patiënten (o.a aspergillose, mucormycose, Fusarium spp.).

Laatst gewijzigd op

13-06-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.