

Myositis geassocieerde antistoffen (immunoblot)

Beschrijving van de test

Naam:	Myositis geassocieerde antistoffen (immunoblot)
Synoniemen:	myositisblot, myositisscreen, myositis, anti-myositis, Mi-2 alfa, Mi-2 bèta, TIF1 gamma, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A, HMGR
Aanvraag code:	25096
Frequentie:	tweewekelijks
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	prof. dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Serum
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00006 Aanvraagbrief Immunologie mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Immunoblotting; EUROBlotMaster (EUROIMMUN).
Deelname EKE:	nee
Interpretatie:	

- Deze blot wordt enkel uitgevoerd indien er een klinisch vermoeden is van myopathie, dermatomyositis of interstitieel longlijden.
- Met deze blot worden IgG auto-autoantistoffen opgespoord tegen 18 verschillende antigenen: Mi-2 alfa, Mi-2 bèta, TIF1 gamma, MDA5, NXP2, SAE1, Ku, PM-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12, EJ, OJ, Ro-52, cN-1A, HMGCR voor de diagnose van dermato- en polymyositis, idiopatische myositis, anti-synthetase syndroom, inclusion body myositis (IBM), necrotiserende myositis en overlap syndromen.

Laatst gewijzigd op

10-04-2024