Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

TPO-antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	TPO-antistoffen
Aanvraag code:	23050
Loinc:	8099-4
Frequentie:	1x per week (meestal op dinsdag)
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	3 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 2 dagen na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Chemiluminescentie immunoassay (CLIA)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Neen
Interpretatie:	

Bij Hashimoto thyroiditis en in de meerderheid van de gevallen van de ziekte van Graves zijn de anti-TPO antilichamen verhoogd. Autoantilichamen kunnen gevonden worden bij minder dan 10% van de normale populatie en bij patiënten met niet-thyroidale ziekten zoals inflammatoire rheumatische aandoeningen.

Eenheid: IU/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	13.80 IU/mL	13.80 IU/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 556091 - 556102 B 250 Doseren van anti-thyroperoxidase antistoffen #(Maximum 1) (Cumulregel 330)
Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

24-09-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.