

17-OH Progesteron

Beschrijving van de test

Naam:	17-OH Progesteron
Synoniemen:	17-OH P
Aanvraag code:	23220, 23215
Loinc:	1668-3
Frequentie:	3x/week, verzending op donderdag
Uitvoerend labo:	Universitair Ziekenhuis Gent
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, plasma heparine tube
Volume:	750 µL
Transportconditie:	Ingevroren
Bewaarconditie:	Diepvries

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname.

Analyse

Analysemethode:	Cobas i601 massaspectrometer
-----------------	------------------------------

IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interpretatie:	Steroïdhormoon gesynthetiseerd vanuit progesteron of 17-OH pregnenolon, en precursor van cortisol en van androgene en oestrogene hormonen. Differentieel diagnostiek van bijnierschorsinsufficiëntie, hyperandrogenisme en hirsutisme. Sterk verhoogd door 21-hydroxylase deficiëntie bij congenitale adrenale hyperplasie (CAH).
Eenheid:	ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur:	559436 - 559440 B 500 Doseran van 17-hydroxyprogesteron #(Maximum 1)(Cumulregel 98 , 210 , 322) Bron: RIZIV website op 04/10/2026
---------------	--

Laatst gewijzigd op

17-09-2026