

Perforine in NK- en T-lymfocyten

Beschrijving van de test

Naam:	Perforine in NK- en T-lymfocyten
Synoniemen:	HLH
Frequentie:	verzending op weekdays (laatste verzending op donderdagmorgen)
Uitvoerend labo:	UVC Brugmann - Victor Horta
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Dr Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Toegelaten recipiënt:	EDTA
Volume:	2.7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• periode bloedafname - staalontvangst 24uur • enkel afname op maandag-woensdag. Staal dient op woensdag voor 16u in het labo te zijn. • patiëntenlabel of Cyberlab etiket aanwezig • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	24u (bijaanvraag na 24u enkel in overleg met klinisch bioloog)

Analyse

Analysemethode:	Flowcytometrie
-----------------	----------------

Interpretatie:

Perforine in NK- en T-cellen wordt gemeten in de diagnosestelling van hemofagocytair lymfohistiocytose (HLH, 'hemofagocytair syndroom'). Voor de diagnose van HLH dient voldaan te worden aan minstens 5 van volgende 8 criteria: koorts, splenomegalie, cytopenie, hypertriglyceridemie en/of hypofibrinogenemie, hyperferritinemie, hemofagocytose, verlaagde NK-celfunctie, verhoogd solubel CD25 (sCD25/sIL2-rec. Ook de analyse van perforine in de NK- en T-cellen kan bijdragen aan de diagnosestelling.

Tarificatie

Nomenclatuur:

555730 - 555741 B 500 Identificatie van een receptor of een membraan- of cytoplasma- of nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA systeem. Het eerste antigeen #(Maximum 1) (Diagnosereg^{el} [43](#))
Bron: RIZIV website op 04/10/2026

Laatst gewijzigd op

29-09-2026