

## Borrelia IgM antistoffen in CSV

### Beschrijving van de test

Naam:	Borrelia IgM antistoffen in CSV
Synoniemen:	borrelia, Borrelia burgdorferi, lyme
Aanvraag code:	56262
Aanvraagbrief:	<a href="#">AFAZFAB00007</a>
Loinc:	22133-3
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	7 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

### Afname van het materiaal

Afname:	CSV
Toegelaten recipiënt:	Steriele tube
Volume:	0,5mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Lumbaal vocht wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het CSV een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard werd in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

### Analyse

Analysemethode:	Enzyme-immunoassay (ELISA Serion/Virion)
-----------------	--

Deelname EKE:	ESfEQA
Interferentie:	Lumbaal vocht waarin bloed aanwezig is, kan minder betrouwbare resultaten opleveren.
Interpretatie:	Bij een vroege neuroborreliose kan deze parameter uitzonderlijk als allereerste serologische parameter positief worden, nog voor Borrelia IgM detectie in perifeer bloed.
Eenheid:	U/mL

## Tarificatie

Nomenclatuur: 552171 - 552182 B 300 Opsporen van IgM antilichamen tegen Borrelia in cerebrospinaal vocht #(Maximum 1)  
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

## Laatst gewijzigd op

06-08-2024