

Chlamydomphila pneumoniae IgA antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Chlamydomphila pneumoniae IgA antistoffen
Synoniemen:	Chlamydia pneumoniae
Aanvraag code:	56268
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00007
Loinc:	6912-0
Frequentie:	1x per week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	7 dagen
24u/24u:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	0,5mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Microimmunofluorescentie (Euroimmun)
-----------------	--------------------------------------

Deelname EKE:	SKML
Interferentie:	Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Interpretatie:	<p>Een positieve IgA bepaling is een sterke indicatie voor een acute <i>Chlamydophila pneumoniae</i> infectie of een recent doorgemaakte reactivatie/reinfectie. Kruisreactie met andere <i>Chlamydia</i> species is mogelijk, maar kan ook te wijten zijn aan coinfectie met meer dan een <i>Chlamydia</i> species.</p> <p>IgA is een parameter die bij volwassenen (12+) beter weergeeft dat er een reactivatie of reinfectie met <i>C.pneumoniae</i> heeft plaatsgevonden, en bij een primaire infectie zal dit type antistoffen enkele dagen na IgM meetbaar worden. Bij kinderen onder 10 jaar (vnl 5 jaar) is IgA-productie nog immatuur/inadequaar voor optimale diagnostiek, en dient men naast IgA zeker eveneens IgM-antistofbepaling te evalueren. De inaccuraat IgA-productie wordt gecompenseerd met relatief hogere titers in IgM & IgG.</p> <p>Opgelet: circa 3% van de West-Europese bevolking is niet in staat om IgA te produceren, en hier is dus de opvolging van de IgG-titers van primordiaal belang voor juiste diagnostiek. Anderzijds heb je eveneens een subgroep van patiënten die "solitaire IgA" productie vertonen. Hiervan is de klinische betekenis onduidelijk.</p> <p>Serokinetiek van <i>Chlamydia trachomatis/Chlamydophila pneumoniae</i> antistoffen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Primaire infectie: <ul style="list-style-type: none"> ○ IgM na 2 - 3 weken (t_{1/2}=5-7 d) ○ IgA na 3 weken (t_{1/2}=6-8 d) ○ IgG na 5 - 8 weken (t_{1/2}=20-25 d) • Reinfectie: <ul style="list-style-type: none"> ○ IgM mogelijk afwezig of lage concentratie ○ IgA na 1 week-10 dagen ○ IgG vroeger & boostereffect: 1-2 weken na infectie (3 dagen- 1 week na IgA) <p>De bacterie zelf kan eveneens aangetoond worden in een diep respiratoir staal in acute fase van infectie dmv respiratoire micro-array analyse (MRESPI).</p>
Eenheid:	Titer

Tarificatie

Nomenclatuur: 551972 - 551983 B 200 Opzoeken van Chlamydia antilichamen
#(Maximum 3)(Cumulregel [327](#))(Diagnoseregel [74](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

21-08-2024

Copyright © 2026 All rights reserved.