

Zopiclone

Beschrijving van de test

Naam:	Zopiclone
Synoniemen:	Zopiclon
Aanvraag code:	ZOPI
Loinc:	80554-9
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Max. 2 weken
TAT Dringend:	1 dag
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Martine Vercammen

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toege laten materiaal:	Plasma
Volume:	6 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)

Analyse

Analysemethode:	HPLC-DAD
Deelname EKE:	LGC Toxicology Scheme: PT-TX-ZMIX
Eenheid:	ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	10-55 ng/mL	10-55 ng/mL

Tarificatie	
Nomenclatuur:	547153 - 547164 B 1600 Doseran van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnosereg ^{el} 49) Bron: RIZIV website op 01/04/2025

Laatst gewijzigd op	
11-12-2024 station	Glims system