

CD19 (B-cellen)

Beschrijving van de test

Naam:	CD19 (B-cellen)
Frequentie:	Van maandag tot en met donderdag tijdens de normale werkuren. Op vrijdag worden stalen ontvangen tot 13h nog afgewerkt op de dag zelf. Stalen ontvangen na 13h worden in overleg met de verantwoordelijk klinisch bioloog of vervanger al dan niet ingezet en afgewerkt op de dag zelf.
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	24 uur (weekdagen behalve vrijdagnamiddag) 72 uur (vrijdagnamiddag)
TAT Dringend:	2 uur (weekdagen)
24u/24u:	nee
Accreditatie:	ISO 15189:2012 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Jan Emmerechts

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Toegelaten materiaal:	Beenmerg, vocht, weefsel (opgelet: referentiewaarden enkel van toepassing op perifeer bloed)
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	• periode bloedafname - staalontvangst 72u • patiëntenlabel aanwezig • in recipiënt zoals aangegeven in de labogids
Bijaanvraag:	72u (bijaanvraag na 72u enkel in overleg met klinisch bioloog)

Analyse

Analysemethode: Flowcytometrie
IVDR status: CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE: Sciensano
Eenheid: %

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
3 maand	6-32 %	6-32 %
3 maand - 6 maand	11-41 %	11-41 %
6 maand - 1 jaar	14-37 %	14-37 %
1 jaar - 2 jaar	16-35 %	16-35 %
2 jaar - 6 jaar	14-33 %	14-33 %
6 jaar - 12 jaar	13-27 %	13-27 %
12 jaar - 18 jaar	6-23 %	6-23 %
> 18 jaar	7-27 %	7-27 %

Tarificatie

Nomenclatuur: 555693 - 555704 B 200 Percentage T lymfocyten, B lymfocyten, CD4 positieve T lymfocyten, CD8 positieve T lymfocyten of natural killer cellen #(Maximum 5)
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

555752 - 555763 B 400 Identificatie van een receptor-, een membraan-, een cytoplasma of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-systeem. De volgende, elk (Maximum 25)(Cumulregel [76](#))(Diagnoseregul [68](#))
Bron: RIZIV website op 01/04/2025

556474 - 556485 B 400 Identificatie van een receptor-, een membraan-, een cytoplasma- of een nucleair antigeen van hematopoïetische cellen, exclusief de antigenen van het HLA-systeem. De volgende, elk #(Maximum 12)(Cumulregel [76](#))(Diagnoseregul [69](#))

Laatst gewijzigd op

07-08-2024
station

Glims system