

Chlamydomphila psittaci IgG antistoffen

Beschrijving van de test

Naam:	Chlamydomphila psittaci IgG antistoffen
Synoniemen:	Chlamydia psittaci, psittacose
Aanvraag code:	56276
Loinc:	6916-1
Frequentie:	2x per week, in functie van het aantal aanvragen. De bacterie zelf kan eveneens aangetoond worden in een diep respiratoir staal in acute fase van infectie dmv respiratoire micro-array analyse (MRESPI).
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 - 14 dagen
TAT Dringend:	6 uur
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Marijke Reynders

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube, Li-heparine tube
Volume:	2,6 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Gestold bloed wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen de 2 uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht AFAZFAB00007 Aanvraagbrief Infectieuze serologie en moleculaire microbiologie
Bijaanvraag:	Indien het serum een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de serotheek, kan een bijaanvraag gebeuren tot 1w na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke microbiologe aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	MIF
Interferentie:	Sterk hemolytische of lipemische monsters kunnen minder betrouwbare resultaten geven.
Interpretatie:	Seroconversie of significante titerstijging bij gepaarde monsters kan een acute of recente infectie bevestigen. De test spoort niet alle infecties met <i>C. psittaci</i> serotypes op, maar wel de meest voorkomende. Kruisreactie met andere <i>Chlamydia</i> species is mogelijk, maar kan ook te wijten zijn aan coinfectie met méér dan één <i>Chlamydia</i> species.
Eenheid:	Titer

Tarificatie

Nomenclatuur:	551972 - 551983 B 200 Opzoeken van <i>Chlamydia</i> antilichamen #(Maximum 3)(Cumulregel 327)(Diagnoseregel 74) Bron: RIZIV website op 01/04/2025
---------------	---

Laatst gewijzigd op

11-12-2024 station	Glims system
-----------------------	--------------