Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Directe bilirubine

Beschrijving van de test

Naam:	Directe bilirubine
Synoniemen:	Bilirubine, direct, geconjugeerd
Aanvraag code:	21201
Loinc:	15152-2
Frequentie:	Dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 uren
TAT Dringend:	1 uur
24u/24u:	Ja
Accreditatie:	ISO 15189:2022 (379-MED)
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Timothy Vanwynsberghe

Afname van het materiaal

Afname:	Li-heparine
Toegelaten materiaal:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Li-heparine, Serum gel tube
Volume:	2,6 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:

- periode bloedafname - staalontvangst 90min
- patiëntenlabel aanwezig
- in recipiënt zoals aangegeven in de labogids

Bijaanvraag: 48 uren max.

Analyse

Analysemethode:	Colorimetrie
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant

Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	1. Hemolyse >1000 mg/dL; Lipemie L-index >750. 2. Heel uitzonderlijk kan gammopathie, in het bijzonder type IgM (Waldenström's macroglobulinemie), onbetrouwbare resultaten geven.
Interpretatie:	Metingen van bilirubine worden gebruikt voor de diagnose van leveraandoeningen, bij de opsporing van hemolytische anemie en bij evaluatie van de verschillende stadia van geelzucht.
Eenheid:	mg/dL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
? 1 jaar		
1 jaar-10 jaar	0.10 mg/dL	0.10 mg/dL
10 jaar-19 jaar	0.80 mg/dL	0.60 mg/dL
> 19 jaar	0.30 mg/dL	0.30 mg/dL

Tarificatie

Nomenclatuur:	540175 - 540186 B 80 Doseren van totale bilirubine en van de fracties ervan #(Maximum 1) (Cumulregel 5) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

22-05-2025

Copyright © 2026 All rights reserved.