

SCC-Squamous Cell Carcinoma antigen

Beschrijving van de test

Naam:	SCC-Squamous Cell Carcinoma antigen
Synoniemen:	Squamous cell carcinoma Ag, SCC
Frequentie:	Verzending op donderdag - analyse frequentie onderaannemer 1 per week
Uitvoerend labo:	UZ Leuven campus Gasthuisberg
TAT:	2 weken
24u/24u:	nee
Accreditatie:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube
Volume:	1 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Bloedafname met handschoenen, de dop van de tube niet aanraken met de huid, omwille van contaminatiegevaar met vals-positieve resultaten tot gevolg. SCC is namelijk aanwezig op de huid.
Bijaanvraag:	Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname.

Analyse

Analysemethode:	Abbott Alinity immunoassay
-----------------	----------------------------

Deelname EKE:	nee
Interpretatie:	Het SCC antigen is een tumormerker voor opvolging van squameus cel carcinoom van de baarmoederhals (cervixcarcinoom).
Eenheid:	µg/L

Laatst gewijzigd op

11-12-2024
station

Glims system