Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

# Titer anti-B

## Beschrijving van de test

| | |
|---|---|
| Naam: | Titer anti-B |
| Synoniemen: | Anti-A, anti-B |
| Aanvraag code: | 14150 |
| Aanvraagbrief: | AFAZFAB00001 |
| Loinc: | 30201-8 |
| Frequentie: | weekdagen |
| Uitvoerend labo: | AZ Sint Jan |
| TAT: | 24 uur |
| 24u/24u: | nee |
| Verantwoordelijke bioloog: | Dr Jan Emmerechts |

## Afname van het materiaal

| | |
|---|---|
| Afname: | EDTA |
| Toegelaten materiaal: | plasma |
| Volume: | 2,7 mL EDTA; 200 µL plasma |
| Transportconditie: | Kamertemperatuur |
| Bewaarconditie: | Kamertemperatuur |

## Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

| | |
|---|---|
| Acceptatie: | Stalen moeten gelabeld zijn met naam, voornaam en geboortedatum |
| Bijaanvraag: | Max. 3 d na staalafname |

## Analyse

| | |
|---|---|
| Analysemethode: | Immunologische bepaling met kolomagglutinatietechnologie. |
| Deelname EKE: | Ja |
| Interferentie: | Sterke hemolyse |
| Interpretatie: | |

Bij ABO incompatibele stamceltransplantatie tussen donor en patiënt kan een hoge titer anti-A of anti-B de oorzaak zijn van hemolyse na stamcelinfusie. Bij hoge titers wordt de procedure voor de verwerking van stamcelle en voor stamcelinfusie aangepast.
Bij fetomaternele ABO incompatibliteit is het belangrijk na te gaan of de anti-A of anti-B antistoffen van het IgG of IgM type zijn gezien de IgG type antistoffen transplacentair kunnen gaan en hemolyse veroorzaken bij de fetus en/of pasgeborene.
Hierbij wordt de titer van immuun (IgG) anti-A of anti-B bepaald.

| | |
|---|---|
| Eenheid: | Titer |

## Tarificatie

| | |
|---|---|
| Nomenclatuur: | 555170 - 555181 B 200 Titreren van onregelmatige anti-erythrocyten antilichamen in geval het opzoeken positief is, per antilichaam #(Maximum 3)<br>Bron: RIZIV website op 22/11/2026 |

## Laatst gewijzigd op

12-10-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.