

Anti-thyroglobuline

Beschrijving van de test

Naam:	Anti-thyroglobuline
Aanvraag code:	23060
Loinc:	8098-6
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	3 dagen
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	dr. Michel Langlois

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten recipiënt:	Serum gel tube
Volume:	4,7 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	AFAZFAB00001 Aanvraagbrief Algemene laboratoriumtesten Indien het specimen een correcte pre-analytische fase onderging, en sindsdien bewaard wordt in de koelruimte/diepvries kan een bijaanvraag gebeuren tot 1 week na afname. Indien de bijaanvraag later komt, is overleg met verantwoordelijke klinisch bioloog aangewezen.

Analyse

Analysemethode:	Chemiluminescentie immunoassay (CLIA)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	nee

Interpretatie: Verhoogde anti-TG concentraties worden gevonden bij ziekte van Graves en Hashimoto's thyroïditis.
Eenheid: IU/mL

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	4.50 IU/mL	4.50 IU/mL

Tarificatie

Nomenclatuur: 556076 - 556080 B 250 Doseran van anti-thyroglobuline antistoffen #(Maximum 1) (Cumulregel [330](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

05-08-2024