

## Antidepressiva screening

### Beschrijving van de test

Naam:	Antidepressiva screening
Synoniemen:	Antidepressiva
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Max. 5 dagen
TAT Dringend:	1 dag
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

### Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Volume:	7,5 mL

### Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (2 dagen).

### Analyse

Analysemethode:	Homogenous enzyme immunoassay (Siemens Healthineers); HPLC-DAD.
Interferentie:	Aanwezigheid van bepaalde medicatie kan positieve of negatieve interferentie veroorzaken, zie firma bijsluiter.
Interpretatie:	Immunoassay detecteert vanaf 300 ng/mL amitriptyline, desipramine, imipramine en nortryptiline; vanaf 500 ng/mL clomipramine, dothiepin, doxepin, nordoxepin, protriptyline; vanaf 600 ng/mL trimipramine; zowel positieve als negatieve

stalen op immuno-assay worden verder geanalyseerd met HPLC.

## Tarificatie

Nomenclatuur: 547352 - 547363 B 250 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische methode. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode #(Maximum 4)(Cumulregel [71](#))(Diagnoseregel [49](#))  
Bron: RIZIV website op 14/06/2026

## Laatst gewijzigd op

25-03-2026