

Ethosuximide

Beschrijving van de test

Naam:	Ethosuximide
Synoniemen:	Zarontin
Aanvraag code:	29114
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Loinc:	3616-0
Frequentie:	2 keer per week
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	1 week
TAT Dringend:	1 dag (weekdagen)
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Heparine plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube, heparine tube
Volume:	200 µL
Speciale afname condities:	Dalspiegel
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Koelkast

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	Het specimen wordt zo snel mogelijk, bij voorkeur binnen het uur na afname, op kamertemperatuur naar het laboratorium gebracht.
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (5 dagen)

Analyse

Analysemethode:	LC-MS/MS
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	LGC - Therapeutic Drugs (TDM)
Interpretatie:	Dalspiegel (= bloedafname net vòòr inname medicatie) tijdens steady-state vereist. Steady-state wordt bereikt na toediening constante dosis gedurende ten minste 4-6 halflevens ($t_{1/2}$ 33-55u).
Eenheid:	mg/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	40-100 mg/L	40-100 mg/L

Tarificatie

Nomenclatuur: 548295 - 548306 B 1600 Doseran van een anti-epilepticum, met uitzondering van fenobarbital, fenytoïne, carbamazepine en valpronezuur, met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) #(Maximum 2)(Diagnose 46)
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

14-04-2026