

Zopiclone

Beschrijving van de test

Naam:	Zopiclone
Synoniemen:	Zopiclon
Aanvraag code:	ZOPI
Loinc:	80554-9
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
TAT Dringend:	1 dag
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	Serum
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum-gel tube, Li-heparine tube
Volume:	700 µL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)

Analyse

Analysemethode:	HPLC-DAD
Deelname EKE:	LGC Toxicology Scheme: PT-TX-ZMIX
Eenheid:	ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

10-55 ng/mL

10-55 ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur:

547153 - 547164 B 1600 Doseran van een xenobioticum en zijn metabolieten met een specifieke chromatografische methode (HPLC of GC) of met een minstens evenwaardige methode, met uitzondering van de farmaca vermeld onder Therapeutische Monitoring, paracetamol (547212 - 547223), salicylaten (547013 - 547024), ethanol (547035 - 547046, 547050 - 547061), methanol (547315 - 547326), hogere alcoholen en glycolen (547072 - 547083) #(Maximum 3)(Diagnoseregel [49](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

25-03-2026