

Benzodiazepinen screening

Beschrijving van de test

Naam:	Benzodiazepinen screening
Synoniemen:	Benzodiazepine
Frequentie:	dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Max. 2 weken
TAT Dringend:	4 uur
24u/24u:	ja
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Volume:	10 mL
---------	-------

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (2 dagen).

Analyse

Analysemethode:	Enzyme immunoassay (ARK Diagnostics); GC-MS
Interpretatie:	De immuno-assay assay is gecalibreerd op etizolam, gedetecteerd vanaf 100 ng/mL. Andere benzodiazepines worden met hogere of lagere gevoeligheid gedetecteerd, naargelang de mate van kruisreactiviteit. Ieder monster hetzij negatief, hetzij twijfelachtig, hetzij positief wordt geconfirmeerd met HPLC.

Tarificatie

Nomenclatuur: 547794 - 547805 B 250 Opzoeken van xenobiotica met een kwalitatieve immunologische test. Een positief resultaat moet bevestigd worden met een specifieke chromatografische methode #(Maximum 5)(Cumulregel [73](#))(diagnoseregel [49](#))
Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

25-03-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.