

Flecainide

Beschrijving van de test

Naam:	Flecainide
Synoniemen:	Flecaïnide
Aanvraag code:	29002
Loinc:	3638-4
Frequentie:	wekelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	2 weken
TAT Dringend:	1 dag
24u/24u:	nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Toegelaten materiaal:	Plasma
Toegelaten recipiënt:	Serum-zonder gel tube, EDTA tube. Opgelet: geen gel
Volume:	1,2 mL

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)

Analyse

Analysemethode:	HPLC-DAD
Deelname EKE:	LGC Therapeutic Drugs Monitoring Scheme: PT-TM-CRD
Eenheid:	ng/mL

Referentiewaarden

Leeftijd

Mannen

Vrouwen

400-800 ng/mL

400-800 ng/mL

Tarificatie

Nomenclatuur:

548052 - 548063 B 350 Doseran van een anti-aritmisch geneesmiddel of van de actieve metaboliet ervan #(Maximum 2)(Diagnoseregel [46](#))

Bron: RIZIV website op 26/04/2026

Laatst gewijzigd op

02-04-2026