Contactgegevens:
T: 050/45 99 00
M: laboratorium.secretariaat@azsintjan.be

Everolimus

Beschrijving van de test

Naam:	Everolimus
Synoniemen:	Certican
Aanvraag code:	29160 (in-house); 29157 (verzending)
Aanvraagbrief:	AFAZFAB00009
Loinc:	50544-6
Frequentie:	Immunoassay (in house): dagelijks, behalve op zondag. LC-MS/MS (verzending naar UZ Gent): dagelijks
Uitvoerend labo:	AZ Sint Jan
TAT:	Immunoassay (in house): van maandag t.e.m. zaterdag: indien staal in labo vóór 13h: resultaat zelfde dag gekend. LC-MS/MS (verzending naar UZ Gent): 2 dagen
24u/24u:	nee
Accreditatie:	Nee
Verantwoordelijke bioloog:	Apr. biol. Louis Nevejan

Afname van het materiaal

Afname:	EDTA
Volume:	2,7 mL
Transportconditie:	Kamertemperatuur
Bewaarconditie:	Kamertemperatuur

Criteria voor aanvaarding of bijaanvraag

Acceptatie:	1) Periode afname – staalontvangst 90 min; 2) Stalen gelabeld; 3) In conform recipiënt **Analyse via LC-MS/MS (verzending naar UZ Gent): afname niet mogelijk op vrijdag! Stalen afgenomen op donderdag moeten vòòr 16u in het labo zijn.**
Bijaanvraag:	Mogelijk zo lang moedertube in gekoelde opslag (3 dagen)

Analyse

Analysemethode:	Immunoassay (in house): Elecsys (Cobas Pure, Roche); LC-MS/MS (verzending naar UZ Gent): iISD (Cobas i601, Roche)
IVDR status:	CE-IVD test gebruikt volgens instructies fabrikant
Deelname EKE:	Ja
Interferentie:	Immunoassay (in house): kruisreactie met sirolimus. Interferentie bij inname biotine (> 5mg/dag) 8 uur voor de bloedafname; of bij hoge titers van antilichamen tegen cyclosporine, streptadivin of ruthenium.
Eenheid:	µg/L

Referentiewaarden

Leeftijd	Mannen	Vrouwen
	3.0-8.0 µg/L	3.0-8.0 µg/L

Tarificatie

Nomenclatuur:	548413 - 548424 B 600 Doseren van immunosuppressiva, per immunosuppressivum #(Maximum 3)(cumulregel 40, 227)(Diagnoseregel 46, 51) Bron: RIZIV website op 22/11/2026

Laatst gewijzigd op

31-07-2026

Copyright © 2026 All rights reserved.